

Post-Concussie Symptoom Catastrofering Schaal (PCS-CS)

Auteurs: Melloney Wijenberg, Skye King, Sven Stapert, Jeanine Verbunt & Caroline van Heugten

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, Maastricht University & Adelante Zorggroep

Augustus 2024

Opmerking: Dit is een forward-backward Engelse vertaling van de Nederlandse gevalideerde PCS-CS versie en is niet apart gevalideerd. Deze vertaling is afkomstig van: Wijenberg, M. L., Hicks, A. J., Downing, M. G., Van Heugten, C. M., Stapert, S. Z., & Ponsford, J. L. (2020). Relevance of the fear-avoidance model for chronic disability after traumatic brain injury. *Journal of Neurotrauma*, 37(24), 2639-2646.

De PCS-CS, aangepast van de Pain Catastrophizing Scale (PCS), is gevalideerd voor het beoordelen van catastrofes over aanhoudende klachten bij patiënten met licht traumatisch hersenletsel/ hersenschudding. De scoring is gebaseerd op de validatiestudie van King, et al. (2024). Referentiescores zijn te vinden in het onderzoek (King, et al., 2024), maar voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de scores vanwege scheefheid in de verdeling en bodemeffecten.

Scoring Handleiding

Score berekenen

De items krijgen een score van 0 (helemaal niet) tot 4 (altijd).

Totaalscore: Een totaalscore wordt verkregen door alle items van de vragenlijst bij elkaar op te tellen.

Scores op subschalen:

Uitvergroting: Tel items 6, 7 en 13 bij elkaar op

Ruminatie: Tel items 8, 9, 10 en 11 bij elkaar op

Hulpeloosheid: Tel items 1, 2, 3, 4, 5, en 12 bij elkaar op